

• 心脏专栏 •

树突状细胞调节心肌梗死的机制及治疗策略研究进展

杨 星¹, 陈晓延²(综述), 宁忠平³, 李延飞^{3*}(审校)

(1.上海理工大学健康科学与工程学院肿瘤心脏病实验室,上海 200093;2.上海健康医学院医学技术学院
肿瘤心脏病实验室,上海 201318;3.上海市浦东新区周浦医院心血管内科,上海 201318)

[摘要] 心肌梗死(myocardial infarction, MI)由冠状动脉阻塞引起,是全球主要致死和致残原因。树突状细胞(dendritic cells, DCs)在 MI 后的炎症反应和心脏重塑中起重要作用。本综述着重探讨了 DCs 在 MI 中的调控机制,尤其关注了 DCs 衍生的外泌体(DC-derived exosomes, DEX)以及耐受性 DCs(tolerogenic dendritic cells, tDCs)在 MI 治疗中的潜在应用前景。

[关键词] 心肌梗死;树突细胞;治疗;综述文献 doi:10.3969/j.issn.1007-3205.2025.01.006

[中图分类号] R542.22 **[文献标志码]** A **[文章编号]** 1007-3205(2025)01-0030-07

心肌梗死(myocardial infarction, MI)是一种严重的心血管疾病,它由冠状动脉的阻塞导致心肌缺血和缺氧,最终引起心肌组织坏死,是全球主要的死亡原因之一^[1]。MI 不仅严重影响患者的生活质量,还可能导致心力衰竭和猝死等严重并发症^[2]。尽管现代医学技术和治疗手段取得了显著进步,但 MI 后的心肌修复问题仍面临诸多挑战。免疫治疗,特别是利用树突状细胞(dendritic cells, DCs)的策略,为心肌修复提供了新的视角。DCs 作为关键的抗原提呈细胞,在调节免疫应答、维持免疫平衡和抑制炎症反应中具有重要作用。研究^[3]表明,DCs 在 MI 中通过参与炎症反应的调节,影响心肌修复和重塑。MI 发生后,心肌细胞释放损伤相关分子模式和自身抗原激活 DCs。DCs 在这一过程中经历代谢重编程,以适应氧张力下降和代谢物供应有限的环境,从而促进梗死区域的修复^[4]。这为利用 DCs 治疗 MI 提供了新的策略,有望改善心脏功能并预防心血管事件。因此,本文就 DCs 在 MI 过程中的作用进行综述,重点阐述 DCs 在炎症反应、心室重构和纤维化中的作用,介绍了当前基于 DCs 的治疗策略,以期对相关领域研究提供技术支持。

1 DCs 的特性和功能

DCs 是最有效的抗原提呈细胞之一,通过其表面的主要组织相容性复合物(major histocompatibility complex, MHC)分子,对抗原进行识别、捕获、处理,并呈递给 T 细胞,有效激活特异性免疫应答。DCs 的抗原呈递效率高,且倾向于避免非特异性 T 细胞激活,因而被誉为“专业抗原提呈细胞”。DCs 具备直接吞噬功能,能够清除脂质、抗原及凋亡细胞。此外,它们通过分泌细胞因子和趋化因子,间接调节免疫反应,动员其他免疫细胞参与疾病防御^[5]。这些特性赋予 DCs 在免疫调节和疾病治疗中的重要地位,在免疫调节和疾病治疗中具有重要的应用前景,为免疫治疗策略的开发提供了坚实的基础。

DCs 分为经典树突状细胞(conventional dendritic cells, cDCs)、浆细胞样 DCs(plasmacytoid DCs, pDCs)、单核细胞衍生树突状细胞(monocyte-derived DCs, MoDCs)、驻留在表皮的朗格汉斯细胞(langerhans cells, LCs),以及髓源性树突状细胞(myeloid DCs, mDCs)^[6]。其中 cDCs 主要包含 1 型 cDC(cDC1)和 2 型 cDC(cDC2)。见表 1。

[收稿日期]2024-08-30

[基金项目]浦东新区卫生健康委员会临床高峰学科建设计划(PWYgf2021-04)

[作者简介]杨星(2000-),女,安徽淮南人,上海理工大学健康科学与工程学院医学硕士研究生,从事心血管病诊疗研究。

* 通信作者。E-mail:liyf@sumhs.edu.cn

表 1 DCs 的分类和功能

DCs	亚型	转录因子	表面标志物	主要功能
cDC	cDC1	碱性亮氨酸拉链转录因子 ATF 样蛋白 3(basic leucine zipper ATF-like transcription factor 3, BATF3)、干扰素调节因子(interferon regulatory factor,IRF) 8、DNA 结合抑制因子 2(inhibitor of DNA binding 2,ID2)、核因子白介素 3 (nuclear factor, interleukin 3 regulated, NFIL3)、锌指和 BTB 域 46(zinc finger and BTB domain containing 46, Zbtb46)	分化簇(cluster of differentiation, CD)8α、CD103、X 型趋化因子受体 1(X-C motif chemokine Receptor 1,XCR1)、C 型凝集素样受体 9A (C-type lectin domain family 9 member A, CLEC9A)、树突状细胞特异性细胞间黏附分子 3 捕捉无整合素(dendritic cell-specific intercellular adhesion molecule-3-grabbing non-integrin, DEC-205)、人类白细胞抗原 DR (human leukocyte antigen-DR, HLA-DR)	向 CD8 T 细胞呈递外源性细胞, 负责抗病毒和抗肿瘤免疫反应
	cDC2	IRF4、Notch 同源基因 2(notch homolog 2, Notch2)、Purine 富集盒 1(purine-rich box 1, PU.1)、v-rel 网状内皮病毒致癌基因同源物 B(v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog B, RelB)、ID2	CD11b、CD172a、CD1c、CD209、CD86、HLA-DR、CD40	向 CD4 T 细胞呈递可溶性抗原, 调节细胞外病原体、寄生虫和过敏原引起的免疫反应
pDCs		E2-2 转录因子(E2-2 transcription factor, E2-2)、IRF7、IRF8、Spi-B 转录因子(spi-B transcription factor, Spi-B)、Runt 相关转录因子 2 (runt-related transcription factor 2, Runx2)	CD123、血液树突状细胞抗原 (blood dendritic cell antigen , BDCA)-2、BDCA-4、CD4	负责产生大量的 I 型干扰素, 在抗病毒免疫中发挥重要作用
MoDCs		IRF4、IRF8、PU.1 转录因子(PU.1 transcription factor, PU.1)、核因子 κB(nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells, NF-κB)	CD11c、HLA-DR、CD80、CD86	促进炎症反应
LCs		PU.1、克鲁伯样因子 4(Krüppel-like factor 4, KLF4)、IRF4、Notch 信号通路(Notch Signaling Pathway, Notch)	CD1a、CD207、上皮钙黏蛋白(epithelial cadherin, e-cadherin)、CD11c、CD86、MHC II	调节炎症反应, 维持皮肤的免疫平衡和防御功能
mDCs		PU.1、IRF4、IRF8、网状内皮白血病 B(reticuloendothelial leukemia B, RelB)、Zbtb46	CD11c、CD11b、MHC II、CD40、CD80、CD86、CD83、C-C 类趋化因子受体(C-C chemokine receptor , CCR)7	促肿瘤、负向调控免疫应答

2 DCs 在 MI 中的分布和调节

健康的心脏,DCs 主要存在于主动脉瓣中,并促进外周耐受性的发展。MI 后所有 DCs 亚群都会浸润心脏,但在 MI 的急性期,患者体内的 mDCs 数量显著降低^[7]。这可能与患者外周血中 DCs 的成熟表型上调有关,导致它们向动脉粥样硬化斑块和次级淋巴组织迁移增加。这些迁移的 DCs 激活了 T 淋巴细胞,导致斑块破裂和局部炎症免疫反应加剧,并在次级淋巴组织中促进了初始 T 淋巴细胞的激活,加速了病情的发展。在人体中,心脏自身抗原 α-肌球蛋白重链(alpha-myosin heavy chain, α-MyHC)的中枢耐受性丧失,可能会导致心脏自身反应性 T 细胞的循环增加,从而在 MI 后使心脏更容

易受到自身免疫攻击^[8]。在 MI 的免疫调节机制中,DCs 的激活和成熟在心脏自身免疫反应中扮演着关键角色。特别是在 MI 后,心脏 DCs 的激活增加了 α-MyHC 的呈递量,不同类型的 DCs 在免疫应答中发挥着不同的作用。在稳态下,α-MyHC 通过 cDC1 在心脏引流纵隔淋巴结(mediastinal lymph nodes,mLN)中呈递,促进特异性 CD4⁺ T 细胞的增殖并将其分化为调节性 T 细胞(regulatory cells, Tregs)^[9]。Tregs 通过下调 DCs 的共刺激分子 CD80 和 CD86 来抑制炎症。MI 后,激活的 cDCs 在心脏内聚集,上调了 CCR7 和 CD40 的表达,诱导 CD86 表达和 CD4⁺ T 细胞增殖,并伴随促炎因子干扰素 γ(interferon-γ, IFN-γ)和白细胞介素(interleukin,IL)-17 的产生。值得注意的是,只有

cDCs 迁移到 mLN,才能在功能上发挥关键病理作用。因此,MI 通过 DCs 的成熟和迁移激活自身反应性 T 细胞,从而调控 MI 的免疫过程,有望改善心脏功能^[10]。然而,尽管成熟 DCs 的数量与左心室功能障碍相关,但去除某些 DCs 亚群也可能导致不良心肌重构^[11]。关于 DCs 在 MI 后的作用,尤其是其是否具有有害贡献,仍存在争议,具体机制尚不明确。深入研究 DCs 在 MI 中的作用机制将有助于开发新的治疗策略,改善预后。

3 DCs 对 MI 心肌细胞的免疫调节机制

3.1 炎症反应 在 MI 进展过程中,炎症反应被视为关键因素,直接影响心脏组织的结构和功能^[12]。在 MI 过程中,DCs 的激活及其表型对于心肌愈合至关重要,促炎和抗炎之间的微妙平衡决定了其病理上的恢复与否。MI 后的第 1 天,DCs 浸润到心肌损伤部位,其中促炎亚型的 DCs,特别是表达 CD209 的亚群比例上升,这加剧了局部的炎症反应^[13]。随着时间的推移,炎症反应逐渐向修复阶段过渡,此时表达 CCR7 的 DCs 通过上调 CD80、诱导性 T 细胞共刺激分子配体 (inducible T-cell costimulator ligand, Icosl) 或 CD274 等分子的表达介导免疫清除,同时抗炎因子如 IL-10 和胰岛素样生长因子的信号转导显著增加,这有助于抑制炎症过程,从而减轻 MI 引起的心肌损伤^[13]。

MI 诱导的炎症反应通常伴随着巨噬细胞向 M1 表型的极化,以及 T 细胞的激活。在这个过程中,DCs 通过调节巨噬细胞和成熟 T 细胞反应,从而抑制炎症反应。在 MI 模型中发现,DCs 的耗竭导致促炎性 Ly6C^{high} 单核细胞和 M1 型巨噬细胞的浸润增加,促进 Th1 反应,加剧心肌损伤^[14]。而 DCs 的存在有利于抗炎 Ly6C^{low} 单核细胞和 M2 型巨噬细胞在梗死区域的募集,促进 MI 特异性 Tregs 系统的激活,改善切口愈合并维持左心室的收缩活动,对 MI 后的愈合过程起着保护作用^[14-15]。在小鼠心肌损伤的实验模型中,DCs 表达交叉启动相关标记物例如 X-C 基序趋化因子受体 1 (X-C motif chemokine receptor 1, XCR1) 和 C 型凝集素受体 9a 的水平升高,这些 DCs 表现出 MHC II 的高表达,暗示了它们在成熟和抗原呈递能力上可能有所增强^[16]。在模拟冠状动脉缺血和心脏泵功能不全的动物模型中,观察到系统性 XCR1⁺ cDC1 细胞群体的扩增。XCR1⁺ cDC1 细胞的耗竭能够抑制 Th1 细胞的激活,进而保护心脏泵功能免受进一步损害^[17]。这些发现指出,在心脏损伤和修复过程中,

特定 DC 亚群的动员和功能可能起着至关重要的作用。近期的研究发现,CD4 效应记忆 T 细胞与 DCs 之间的相互作用,通过非规范干扰素基因刺激因子 (stimulator of interferon genes, STING)-NF- κ B 途径,激活了 DCs 中的 NF- κ B 信号,导致炎症因子 IL-1 β 和 IL-6 的转录诱导和功能产生减少^[18]。STING 的缺失不仅影响了炎症细胞因子的产生,也可能影响了随后的免疫细胞招募和激活,这对于 MI 后的炎症调节和组织修复至关重要。这提示 STING-NF- κ B 信号轴可能成为治疗 MI 后炎症的潜在靶点。

综上所述,DCs 在 MI 后的炎症反应中发挥着关键作用。它们不仅参与抗原的捕获和呈递,还可能通过与巨噬细胞、T 细胞的相互作用,调节免疫应答的强度和质量,为 MI 后炎症的潜在治疗靶点提供了新的视角。

3.2 心脏重塑与纤维化 心脏重塑是 MI 后心脏结构和功能变化的复杂过程,DCs 在心脏重塑中起到至关重要的保护作用。研究表明,在 DCs 缺失的小鼠模型中,心脏扩张加速,左心室功能恶化,凸显了 DCs 的重要性^[9]。在小鼠急性 MI 模型中,DCs 通过激活心脏特异性自身反应性 CD4⁺ T 细胞,对心脏功能的改善起到关键作用^[19]。Feng 等^[20]的研究表明,在损伤心脏中 CCR2⁺ cDC2 表达的 CCL17 受 GM-CSF 信号的调控,CCL17 的缺失显著改善了左心室收缩功能,并减轻了左心室扩张、心肌细胞肥大和纤维化等心脏重塑的关键特征。然而,DCs 的作用并非总是有益的。在某些情况下,DCs 的功能障碍可能与特定的分子机制有关,例如 CD73 缺陷的 DCs 功能障碍可能与叉头框 P3 蛋白的核水平降低有关,这可能影响其在 MI 后心肌重构中的保护作用^[21]。

心脏纤维化过程中,DCs 的迁移、成熟和递呈能力得到增强^[22]。研究^[23]发现,梗死心肌组织中浸润性 CD209⁺ DC 和 CD11c⁺ DC 的数量与纤维化的程度呈显著正相关,通过特异性消耗 DCs 或限制其活化和迁移,观察到纤维化程度的减少,心脏收缩功能得到改善^[24]。这些研究结果提示,DCs 的调节可能对心脏纤维化具有治疗潜力。进一步的机制研究表明,DCs 通过调节细胞因子如 IL-23 的表达,可能影响 T 细胞的活化和炎症反应,进而调节心脏纤维化的过程^[25]。此外,DCs 释放的中性粒细胞明胶酶相关脂钙蛋白可影响心脏纤维细胞的转录,导致炎症因子和胶原蛋白的增加,从而促进心脏纤维化^[25]。Ikeda 等^[26]的研究通过使用 α -半乳糖神经

酰胺 (α -galactosylceramide-pulsed dendritic cells, α GCDCs)刺激 DCs,发现 α GCDCs 治疗能够激活不变自然杀伤因子 T 细胞,延长扩张型心肌病小鼠的生存期,并防止左心室射血分数的下降。更重要的是, α GCDCs 治疗抑制了心脏间质纤维化的发展,其分子机制包括抑制转化生长因子 β (transforming growth factor- β ,TGF- β)信号通路及其下游纤维化基因的表达,以及通过上调血管生成素 1 (angiopoietin 1,Angpt1)的表达促进受损血管的修复。此外,IFN- γ 通过抑制 TGF- β 诱导的 smad 家族成员 2/3 信号通路,降低了心脏成纤维细胞中纤维化基因的表达,并在心肌细胞中通过信号转导与转录激活因子 1 途径上调了 Angpt1 的表达。

综上所述,DCs 在心脏纤维化中的作用是多方面的,它们不仅参与了心脏纤维化的促进,也可以通过特定的刺激转变为抑制心脏纤维化的效应细胞。因此,DCs 可能成为预防和治疗心脏纤维化的潜在

靶点。未来的研究需要进一步阐明 DCs 在心脏纤维化中的具体作用机制,并探索靶向 DCs 的治疗策略,以改善 MI 后的心脏修复和功能。

4 基于 DCs 的治疗策略

随着对 MI 病理机制的不断深入,人们开始更加重视免疫系统在这一过程中的作用。科研人员正在积极开发新的免疫疗法,旨在通过调节免疫反应来改善 MI 的治疗结果。DCs,作为免疫反应的调节者,它们在 MI 全过程中发挥着至关重要的作用。基于这一认识,以 DCs 为靶点的免疫治疗策略正逐渐展现出其潜在的巨大价值。不同药物对 DCs 功能的影响及其在 MI 治疗中的应用是一个备受关注的研究热点,见表 2。这些研究不仅增进了对 MI 免疫学基础的理解,也为开发新的治疗手段提供了可能,有望通过调节 DCs 的活性来改善 MI 的临床治疗结果。

表 2 DCs 在治疗 MI 中的药物研究

药物类别	对 DCs 的作用机制	结果	MI 治疗中的潜在作用	参考文献
他汀类药物	抑制微小 RNA (microRNAs, miRNAs) lethal 7c 在人 CD83 ⁺ CD86 ⁺ DCs 中的表达	抑制 DCs 成熟,降低了 DCs 激活 T 细胞的能力	对 MI 的发生和发展产生抑制作用	[27]
鞘氨醇-1-磷酸受体调节剂	抑制 T 细胞分化为促炎性的 Th1 或 Th17 细胞	降低 DCs 的免疫刺激性、减少其在淋巴器官中的迁移和数量、调节表面分子表达	减少炎症细胞的浸润,对 MI 后的心脏保护具有潜在效果	[28]
二甲基富马酸	调节 Th1/Th17 和 Th2 细胞分化平衡	抑制 DCs 成熟、改变 DC 细胞因子谱	减轻 MI 后的炎症反应,对心脏保护有潜在作用	[28]
特立氟胺	抑制 NF- κ B 和激活蛋白-1 信号通路,阻断嘧啶合成过程,影响 CD4 ⁺ T 细胞分化为 Th1 和 Th17 细胞的过程	抑制 DCs 的成熟和迁移,减弱了它们产生促炎性细胞因子和趋化因子的能力	对 MI 后的炎症反应,对心脏修复有调节作用	[28]
米托蒽醌	通过免疫抑制作用,干扰 DCs 抗原呈递能力	诱导程序性细胞死亡或细胞溶解	可能对 MI 后的心脏炎症和修复过程有影响	[28]
克拉屈滨	减少炎症细胞因子的产生,促进 T 细胞向 Th2 极化的分化	诱导 DCs 凋亡,影响其成熟和 T 细胞启动能力	降低 MI 后炎症细胞的浸润	[28]
血管紧张素转化酶抑制剂	抑制 CD11c ⁺ DCs 介导的免疫炎症反应	减轻炎症反应	减轻 MI 后的炎症反应,对心脏保护有潜在作用	[29]
过氧化物酶体增殖物激活受体 α 激动剂	能够部分或完全阻断氧化低密度脂蛋白诱导的 DCs 成熟	抑制 DCs 成熟	对 MI 后的心脏保护具有潜在效果	[30]

4.1 DCs 衍生的外泌体 (DC-derived exosomes, DEX) 治疗 MI 细胞外囊泡是细胞释放的膜结构小泡,根据其大小和来源可分为外泌体、微囊泡,以及凋亡小体^[31]。外泌体是 40~160 nm 大小的纳米级细胞外囊泡,源自内吞途径中的多泡体,通过与细胞膜融合释放到细胞外,携带蛋白质、代谢物和核酸等物质,参与细胞间通讯和物质转移。它们因生物相容性和稳定性,成为理想的药物和遗传物质载体。

DEX 具有独特的表面分子,包括功能性的 MHC I、MHC II 和共刺激分子,能够激活特异性的

CD4 和 CD8 T 细胞。DEX 通过间接机制,如结合 DCs 并促使其内吞,以及将外泌体内容物加工呈现于 MHC 分子上,更有效地激活抗原特异性 T 细胞。在 MI 后,心脏 DEX (MI-DEX) 可以直接激活脾脏中的 CD4⁺ T 细胞,并诱导趋化因子的上调,导致更多 DEX 快速迁移和募集到脾脏中。研究证实,通过注射 MI-DEX 激活脾 CD4⁺ T 细胞,趋化因子 IFN- γ 和炎性细胞因子 TNF 的表达增加,白细胞数和促炎单核细胞总数减少,梗死区形成胶原基质,左心室扩张面积缩小,提示 DEX 激活的 CD4⁺ T 细胞

具有改善 MI 后心脏功能的作用^[15]。进一步的研究揭示了 MI-DEX 中的特定分子,如 CCR7 的过表达,能够增强外泌体向脾脏的迁移能力,激活 CD4⁺ T 细胞,诱导抗炎细胞因子 IL-4 和 IL-10 的表达,减轻梗死厚度和纤维化程度,从而改善心脏功能^[32]。研究发现 MI-DEX 中 miRNAs 的表达显著增加,尤其是 miR-494-3p,能够通过上调心脏微血管内皮细胞中的血管内皮生长因子表达,增强心肌的管形成和血管生成,对心脏功能的改善起到关键作用^[33]。这些特性使 DEX 在免疫调节和疫苗开发中具有潜在应用价值。

然而,DEX 作为无细胞疗法的应用存在一些局限性,如产量低、缺乏靶向性、血液循环时间短和肝脏清除速度快,免疫抑制效率差等问题。因此,开发一种新的方法来制备具有靶向 T 细胞和改善免疫抑制能力的 DEX 具有重要意义。基于此,Zhang 等^[32]开发了一种将 DEXs 与海藻酸盐水凝胶结合(DEXs with alginate hydrogel, DEXs-Gel)的新型药物输送系统,以实现 DEXs 的持续释放和延长留存时间。这种系统的应用显著增加了 Treg 细胞和 M2 巨噬细胞的浸润并迁移到梗死边缘区域,激活了 Treg 细胞,并促进了巨噬细胞向修复性 M2 型的转变,进而改善了 MI 后的心脏功能。提示使用 DEX 靶向递送 MI 药物可以提高治疗效率并减少传统药物治疗中的不良反应和毒性反应。DEX 治疗有望成为替代 MI 后传统药物治疗的一种新型预后手段。

4.2 诱导耐受性树突状细胞(tolerogenic dendritic cells, tDCs)治疗 MI 近年来的研究发现,DCs 在调控心脏重塑过程中扮演着重要角色。特别是, tDCs 通过促进 Treg 的增殖和抑制效应 T 细胞的活性,对维持免疫稳态和改善心脏重塑具有积极作用。研究表明, tDCs 能够降低促炎因子的产生,同时增加抗炎因子 IL-10 的水平,从而有助于心脏重塑的改善^[34]。在 MI 的治疗中, tDCs 的应用已经显示出其潜力。例如,在小鼠 MI 模型中,心脏特异性 tDCs 的应用通过诱导 Tregs,对梗死小鼠的心脏重塑产生了积极影响。此外, tDCs 还限制了自身反应性 CD8 T 细胞的扩增,这些细胞在心肌损伤后可能加剧心脏组织的损伤。 tDCs 的活化还导致了淋巴管生成,改善了免疫细胞在心脏组织中的运输和分布,有助于建立免疫抑制微环境,从而帮助 MI 修复。此外, tDCs 治疗还能够调节巨噬细胞的极性,降低 MI 后第 3 天 M1 型巨噬细胞标记物的表达,

并在第 5 天增加 M2 型巨噬细胞标记物的表达,这种转变与心室重塑的改善密切相关^[35]。

此外, T-box 转录因子 1(T-box transcription factor 1, Tbx1)、miR-223、IL-38 等在诱导 tDCs 上发挥着重要作用。 Tbx1 基因,编码一种 T-box 转录因子,是调控 tDCs 功能的关键因素,机制上, Tbx1 诱导的淋巴内皮细胞活化能够渗透到梗死区域,通过产生趋化因子 C-C 基序配体 21(C-C motif ligand 21, CCL21)和表达整合素细胞间黏附分子 1,增加心肌内 tDCs 和 Treg 的数量,有助于减轻心脏损伤后的自身免疫反应^[36]。 miR-223 则通过抑制 IL-1 受体相关激酶 1 和 NF- κ B 信号通路,促进 DC 向 tDCs 的转化^[37]。同时, IL-38 作为一种抗炎细胞因子,能够抑制 DCs 的成熟并促进 tDCs 的形成,对 MI 后的心脏重塑具有保护作用^[38]。

综上所述, DCs 在心脏重塑中的作用不仅限于其直接的免疫调节功能,还包括通过 miR-223 和 IL-38 等分子机制的调控作用。这些发现强调了 DCs、Treg 细胞和巨噬细胞之间相互作用的复杂性,以及它们在心脏重塑中的多方面调控作用。因此,深入理解这些细胞类型和信号通路的具体作用机制,对于开发针对 MI 的新型治疗策略至关重要。未来的研究需要进一步探索如何利用 DCs 的调节潜力,以及如何通过精确调控免疫反应来优化心脏重塑的治疗结果。

5 展 望

目前,普遍认为 MI 并非免疫豁免区,免疫细胞在 MI 区域稳定驻留,负责维持耐受性和免疫监控。然而, MI 发生炎症时, DCs 会浸润心脏组织,导致组织损伤并推动疾病进展。在 MI 的治疗和康复过程中, DCs 也展现了多种心脏保护作用,影响疾病不同阶段。通过调控炎症、促进血管新生、加速瘢痕组织修复及纤维化进程, DCs 显著改善了心室重构并降低不良预后风险。随着对 DCs 在 MI 后心脏修复中作用的深入理解,越来越多的研究正致力于将 DCs 应用于临床治疗,以期发现和开发新的治疗策略。从基础科学研究到临床应用的转化, DCs 的免疫调节功能为心脏修复和再生医学开辟了新的视野。期待未来研究的不断进展,这将进一步深化对 DCs 在 MI 治疗中潜在临床靶点的认识,并为开发创新和有效的治疗手段提供坚实的科学依据。

【参考文献】

[1] Pan J, Zhang L, Li D, et al. Hypoxia-inducible factor-1:

- Regulatory mechanisms and drug therapy in myocardial infarction[J]. *Eur J Pharmacol*,2023,963:176277.
- [2] Yan X, Hou J. miR-22 host gene enhances nuclear factor-kappa B activation to aggravate hypoxia-induced injury in AC16 cardiomyocytes [J]. *Cell Transplant*, 2021, 30: 0963689721990323.
- [3] Zaidi Y, Aguilar EG, Troncoso M, et al. Immune regulation of cardiac fibrosis post myocardial infarction[J]. *Cell Signal*, 2021,77:109837.
- [4] DeBerge M, Chaudhary R, Schroth S, et al. Immunometabolism at the heart of cardiovascular disease [J]. *JACC Basic Transl Sci*,2023,8(7):884-904.
- [5] Zhao Y, Zhang J, Zhang W, et al. A myriad of roles of dendritic cells in atherosclerosis [J]. *Clin Exp Immunol*, 2021,206(1):12-27.
- [6] Song MS, Nam JH, Noh KE, et al. Dendritic cell-based immunotherapy: the importance of dendritic cell migration [J]. *J Immunol Res*,2024,2024:7827246.
- [7] Guerra-de-Blas PC, Cruz-González D, Martínez-Shio EB, et al. Altered phenotype of circulating dendritic cells and regulatory T cells from patients with acute myocarditis [J]. *J Immunol Res*,2022,2022:8873146.
- [8] DeBerge M, Yu S, Dehn S, et al. Monocytes prime autoreactive T cells after myocardial infarction[J]. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*,2020,318(1):H116-H123.
- [9] Sun K, Li Y, Jin J. A double-edged sword of immunomicroenvironment in cardiac homeostasis and injury repair [J]. *Signal Transduct Target Ther*,2021,6(1):79.
- [10] Ji RC. The role of lymphangiogenesis in cardiovascular diseases and heart transplantation[J]. *Heart Fail Rev*,2022,27(5):1837-1856.
- [11] Nian W, Huang Z, Fu C. Immune cells drive new immunomodulatory therapies for myocardial infarction: From basic to clinical translation[J]. *Front Immunol*, 2023, 14: 1097295.
- [12] Foglio E, Pellegrini L, Russo MA, et al. HMGB1-mediated activation of the inflammatory-reparative response following myocardial infarction[J]. *Cells*,2022,11(2):216.
- [13] Zhuang L, Wang Y, Chen Z, et al. Global characteristics and dynamics of single immune cells after myocardial infarction [J]. *J Am Heart Assoc*,2022,11(24):e027228.
- [14] Forte E, Perkins B, Sintou A, et al. Cross-priming dendritic cells exacerbate immunopathology after ischemic tissue damage in the heart[J]. *Circulation*,2021,143(8):821-836.
- [15] Wen H, Peng L, Chen Y. The effect of immune cell-derived exosomes in the cardiac tissue repair after myocardial infarction: Molecular mechanisms and pre-clinical evidence [J]. *J Cell Mol Med*,2021,25(14):6500-6510.
- [16] Saleh D, Jones RT, Schroth SL, et al. Emerging roles for dendritic cells in heart failure [J]. *Biomolecules*, 2023, 13 (10):1535.
- [17] Inui H, Nishida M, Ichii M, et al. XCR1⁺ conventional dendritic cell-induced CD4⁺ T helper 1 cell activation exacerbates cardiac remodeling after ischemic myocardial injury [J]. *J Mol Cell*,2023,176:68-83.
- [18] Meibers HE, Warrick KA, Vonhandorf A, et al. Effector memory T cells induce innate inflammation by triggering DNA damage and a non-canonical STING pathway in dendritic cells [J]. *Cell Rep*,2023,42(10):113180.
- [19] Liu T, Meng Z, Liu J, et al. Group 2 innate lymphoid cells protect mouse heart from myocardial infarction injury via interleukin 5, eosinophils, and dendritic cells[J]. *Cardiovasc Res*,2023,119(4):1046-1061.
- [20] Feng G, Bajpai G, Ma P, et al. CCL17 aggravates myocardial injury by suppressing recruitment of regulatory T cells [J]. *Circulation*,2022,145(10):765-782.
- [21] Zhuang R, Meng Q, Ma X, et al. CD4⁺ FoxP3⁺ CD73⁺ regulatory T cell promotes cardiac healing post-myocardial infarction [J]. *Theranostics*,2022,12(6):2707-2721.
- [22] Ambari AM, Setianto B, Santoso A, et al. Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs) decrease the progression of cardiac fibrosis in rheumatic heart disease through the inhibition of IL-33/sST2 [J]. *Front Cardiovasc Med*,2020,7:115.
- [23] Zhang Y, Wen W, Liu H. The role of immune cells in cardiac remodeling after myocardial infarction [J]. *J Cardiovasc Pharmacol*,2020,76(4):407-413.
- [24] Cadden CJ, Larson A, Awata J, et al. Single nucleus RNA-sequencing reveals altered intercellular communication and dendritic cell activation in nonobstructive hypertrophic cardiomyopathy[J]. *Cardiol Cardiovasc Med*,2022,6(4):398-415.
- [25] Ferreira NS, Tostes RC, Paradis P, et al. Aldosterone, inflammation, immune system, and hypertension[J]. *Am J Hypertens*,2021,34(1):15-27.
- [26] Ikeda M, Ide T, Matsushima S, et al. Immunomodulatory cell therapy using α GalCer-pulsed dendritic cells ameliorates heart failure in a murine dilated cardiomyopathy model [J]. *Circ Heart Fail*,2022,15(12):e009366.
- [27] Khan AW, Paneni F, Jandeleit-Dahm KAM. Cell-specific epigenetic changes in atherosclerosis [J]. *Clin Sci (Lond)*, 2021,135(9):1165-1187.
- [28] Liu C, Zhu J, Mi Y, et al. Impact of disease-modifying therapy on dendritic cells and exploring their immunotherapeutic potential in multiple sclerosis [J]. *J Neuroinflammation*, 2022,19(1):298.
- [29] WolfStephan R, Michael M, Venkata G, et al. ACE inhibition modulates myeloid hematopoiesis after acute myocardial infarction and reduces cardiac and vascular inflammation in ischemic heart failure[J]. *Antioxidants (Basel)*, 2021, 10(3): 396.
- [30] Angelina A, Pérez-Diego M, López-Abente J, et al. Cannabinoids induce functional Tregs by promoting tolerogenic DCs via autophagy and metabolic reprogramming

[J]. Mucosal Immunol,2022,15(1):96-108.

[31] Nasiry D, Khalatbary AR. Stem cell-derived extracellular vesicle-based therapy for nerve injury: A review of the molecular mechanisms[J]. World Neurosurg X, 2023, 19: 100201.

[32] Zhang Y, Gao W, Yuan J, et al. CCR7 mediates dendritic-cell-derived exosome migration and improves cardiac function after myocardial infarction[J]. Pharmaceutics, 2023, 15(2): 461.

[33] Liu H, Zhang Y, Yuan J, et al. Dendritic cell-derived exosomal miR-494-3p promotes angiogenesis following myocardial infarction[J]. Int J Mol Med, 2022, 49(4): 41.

[34] Scalavino V, Liso M, Serino G. Role of microRNAs in the regulation of dendritic cell generation and function[J]. Int J Mol Sci, 2020, 21(4): 1319.

[35] Shao L, Shen Y, Ren C, et al. Inflammation in myocardial infarction: roles of mesenchymal stem cells and their secretome[J]. Cell Death Discovery, 2022, 8(1): 452.

[36] Wang W, Li X, Ding X, et al. Lymphatic endothelial transcription factor Tbx1 promotes an immunosuppressive microenvironment to facilitate post-myocardial infarction repair [J]. Immunity, 2023, 56(10): 2342-2357. e10.

[37] Yuan S, Chen Y, Zhang M, et al. Overexpression of miR-223 promotes tolerogenic properties of dendritic cells involved in heart transplantation tolerance by targeting Irak1 [J]. Front Immunol, 2021, 12: 676337.

[38] Wei Y, Lan Y, Zhong Y, et al. Interleukin-38 alleviates cardiac remodelling after myocardial infarction[J]. J Cell Mol Med, 2020, 24(1): 371-384.

(本文编辑:赵丽洁)

《河北医科大学学报》第七届编辑委员会名单

总 编 辑:王宝山

学 术 顾 问:丛 斌 李春岩 吴以岭 张英泽

副 总 编 辑:贾庆忠 武宇明 王贵英

(按姓氏汉语拼音排序)

编 辑 委 员:

安翠霞	边艳珠	曾瑞红	常英军	陈 伟	陈 炜	陈 源	程亚颖
迟雁青	邓荷萍	刁玉巧	董丽华	杜彦芳	杜媛鲲	房 锋	高静韬
耿左军	郭惠芳	韩振伟	侯志勇	黄立宁	贾庆忠	蒋玉萍	金 萍
李聪慧	李继红	李晓冬	李增宁	林琼真	刘丹岩	刘国彬	刘丽华
刘 庆	刘淑霞	刘晓云	刘亚玲	刘月平	柳 云	卢海燕	吕 哲
马 力	马 莉	马玉霞	马 哲	米 杰	牛凌梅	潘文森	任贵云
任 乾	桑志成	商 微	史海水	史永红	宋 波	苏建玲	孙国柱
孙晓强	田 晖	田子强	王宝山	王 川	王朝宏	王 飞	王贵英
王洪权	王 静	王 军	王 磊	王 莉	王 琦	王 巧	王晓强
王亚东	王玉栋	武宇明	向 柏	阎 雪	杨晓星	游 宾	于宝海
余 伟	袁 芳	张爱莉	张 超	张国强	张国忠	张金艳	张敬宇
张 练	张 敏	张 荣	张 为	张晓琳	张瑛琪	赵 滨	赵东强
赵 群	赵士彭	赵铁梅	赵 昕	赵增仁	赵志明	郑明奇	周亚茹

青年编辑委员:

陈伟 ^(超声)	陈志宇	董江涛	杜英峰	段佳良	冯建科	高鹏骥	高 翔
谷军飞	郭琼梅	郭 炜	胡玉燕	纪 刚	贾云沱	姜 霞	李春年
李德强	李 辉	李 璐	李 莎	李晓婕	梁 军	刘春艳	刘德敏
刘凤侠	刘 辉	刘胜辉	刘文宣	吕 平	吕雅蕾	马芳芳	秦 伟
袁艳梅	任慧玲	桑 威	尚 华	石晓伟	唐 奇	滕 旭	汪雁博
王 冉	王 艳	王 影	王圆圆	温士旺	杨兴肖	张凤宾	赵唐娟